

LEVANTAMENTO DE LOCAL DE SUICÍDIO POR INALAÇÃO DE GLP: ANÁLISE DE IMPORTANTES VESTÍGIOS PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ACIDENTE

Michelle Moreira Machado *

Seção Técnica de Perícias de Crimes Contra a Vida, Instituto de Criminalística – PCMG

Claiton Pires Ventura

Seção Técnica de Perícias de Crimes Contra a Vida, Instituto de Criminalística – PCMG

SITUATION OF SUICIDE BY LPG INHALATION: ANALYSIS OF IMPORTANT TRACES FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ACCIDENTS

RESUMO

O gás liquefeito de petróleo (GLP) é um gás fisiologicamente inerte que em altas concentrações reduz a pressão parcial de oxigênio do ar. Existem diversos casos relatados na literatura, de mortes por asfixia por GLP, principalmente de etiologia acidental. O presente trabalho apresenta o estudo de caso de um indivíduo do sexo masculino, de 46 anos, que foi encontrado morto na cozinha da residência onde morava. O fato ocorreu em junho de 2016 na cidade de Belo Horizonte/MG. A vítima encontrava-se assentada em uma cadeira ao lado do fogão na cozinha. A cabeça estava apoiada na porção posterior do fogão pela região frontal. Apresentava-se em estado de decomposição (período de coloração) e havia hipóstase fixa concentrada na cabeça e extremidades dos membros, compatível com a posição final de seu corpo. Foi constatada a presença de manchas de sangue por escorrimento e contato nas vestes da vítima, e empoçamento no chão sob a cadeira, provenientes da rinorragia que a mesma apresentava. Não havia sinais de arrombamento nas vias de acesso. Os objetos e móveis da residência encontravam-se alinhados. A mangueira do botijão de gás estava desacoplada da extremidade que é fixada ao fogão, estando inserida no interior de um plástico laminado que se encontrava inserido sobre a cabeça da vítima. No levantamento do local em pauta, o método utilizado pela vítima para inalar o gás, que foi acoplar a mangueira do botijão de gás em um saco plástico laminado o qual estava inserido sobre sua cabeça, foram vestígios importantes para se excluir um possível acidente, reforçando assim a hipótese de suicídio. O exame necroscópico é imprescindível para indicar a causa da morte, porém isoladamente não permite definir se o evento em questão trata-se de um suicídio ou acidente, como no caso em análise. O exame de local realizado pelos Peritos revelou não somente sobre a causa da morte, mas principalmente auxiliou no diagnóstico diferencial entre suicídio e morte acidental.

PALAVRAS-CHAVE: Vestígios. Suicídio. GLP. Local de crime. Diagnóstico diferencial.

* michellemmachado@yahoo.com.br